

Памятка

Порядок действия сотрудников при выявлении в образовательном учреждении больного ребенка с многократной рвотой.

- Немедленно изолировать ребенка от здоровых детей для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.
- Обеспечить сотрудника, отвечающего за уборку помещений, всем необходимым для обслуживания, выдать спецодежду (халат, маска, перчатки, колпак, бахилы).
- Детям, играющим рядом с заболевшим ребенком, следует обработать руки, лицо мылом с антисептиком. Желательно убрать (заменить) все игрушки.
- Остатки рвотных масс залить дез. раствором (лучше в аэрозольной упаковке) и немедленно убирать, используя одноразовую ветошь. Уборку и дезинфекцию следует проводить в спец. одежде (халат, маска, перчатки, колпак), с использованием дезинфицирующих средств, с соблюдением концентрации вещества и времени обеззараживания по вирусному режиму. Для экстренной уборки иметь в запасе дезинфицирующие средства многокомпонентные по составу (н-р, ЧАС+глутаровый альдегид).
- По окончании дезинфекции следует утилизировать **маску, перчатки, ветошь, бахилы** (залить дезинфицирующим средством, выдержать экспозицию и выбросить). Обувь протереть дезинфицирующим средством. Емкости, которые были использованы для обработки залить дезинфицирующим средством, выдержать экспозицию.
- Обработать руки кожным антисептиком, надеть чистую спец. одежду и приступить к уборке всей групповой ячейке, сначала с моющим средством, затем обработать все поверхности при помощи дезинфицирующих средств.
- Провести дезинфекцию игрушек (мелкие игрушки методом замачивания в емкости с дезинфицирующим средством, крупные игрушки методом протирания (орошения) дезинфицирующими средствами).
- Всем сотрудникам сменить одежду, заменить полотенца, обработать обувь.
- По окончании уборки провести обеззараживание воздуха (кварцевание) не менее 30 минут (воспользоваться передвижными облучателями при необходимости).